



العربية | Arabic

لقاحات كوفيد-19

التطعيم للأطفال بعمر 5-11 عاماً - الرسائل الرئيسية

سارية اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول 2021

الرسائل الرئيسية

- الأطفال بعمر 5-11 عاماً أصبحوا الآن مؤهلين للتطعيم ضد كوفيد-19.
- توصي المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالتحصين (ATAGI) بلقاح فايزر Pfizer للأطفال بعمر 5-11 عاماً.
- يستند ذلك على الموافقة المؤقتة من إدارة السلع العلاجية (TGA) على لقاح فايزر Pfizer ضد كوفيد-19 للأطفال في هذه الفئة العمرية.
- توصي مجموعة ATAGI بتركيب جرعة للأطفال بعمر 5-11 عاماً تعادل ثلث الجرعة المعطاة للأشخاص بعمر 12 عاماً وأكثر.
- من المتوقع أن يبدأ تطعيم الأطفال بعمر 5-11 عاماً اعتباراً من 10 يناير/كانون الثاني 2022.
- سيتوفر اللقاح من خلال العيادات العامة المشاركة والصيدليات والمنظمات الصحية المجتمعية للسكان الأصليين Aboriginal Controlled Community Health Organisations ومراكز التطعيم الملائمة للأسرة بالولاية. كما ستكون هناك أيضاً بعض عيادات التطعيم المجتمعية، بما في ذلك في المدارس الابتدائية، خلال الفصل الدراسي الأول 2022.

سلامة اللقاح للأطفال بعمر 5-11 عاماً

- قامت TGA وATAGI بمراجعة الأدلة السريرية وبيانات السلامة من التجارب السريرية للقاحات mRNA للأطفال بعمر 5-11 عاماً وبيانات واقعية من تطعيمات هذه المجموعة العمرية في الولايات المتحدة.
- في التجربة السريرية للقاح فايزر Pfizer والتي شملت 3,100 طفلاً، لم تكن هناك أي مخاوف بشأن سلامة اللقاح ولم يتم تشخيص أي آثار جانبية خطيرة.
- ويتم بالفعل إعطاء اللقاحات للأطفال بعمر 5-11 عاماً في الولايات المتحدة، حيث تلقى ما يقرب من 5 ملايين طفل الجرعة الأولى بالفعل، مع بدء البرامج المماثلة في كندا وأوروبا وإسرائيل وأماكن أخرى.
- تُجري [AusVaxSafety](https://www.ausvaxsafety.gov.au) مراقبة مستمرة وشاملة لسلامة اللقاحات في المجتمع الأسترالي.

تطعيم الأطفال ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة

- يتم التخطيط للخيارات والدعم الذي يمكن الحصول عليه للأطفال الذين قد تكون لديهم مخاوف طفيفة بشأن التطعيم أو مشاكل سلوكية بسيطة، وكذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات في النمو أو التوحد أو مشاكل حسية.
- كما ستتوفر أيضاً خدمات للأطفال الذين يعانون من خوف شديد من الإبر.

فوائد التطعيم للأطفال بعمر 5-11 عاماً.

- سيحصل الأطفال الذين تم تطعيمهم على حماية مباشرة ضد كوفيد-19.

- وبينما الأطفال والشباب اليافعون هم أقل عرضة مقارنة بالبالغين في أن يتعرضوا لأعراض شديدة في حال الإصابة بكوفيد-19، إلا أن البعض منهم قد يمرض بشدة - وهذا يشمل الأطفال الذين يعانون من حالات معينة موجودة مسبقاً، مثل السمنة المفرطة أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي.
- يمكن أن يصاب بعض الأطفال والمراهقون أيضاً بأعراض مزمنة، بعد أكثر من شهر أو شهرين من الإصابة بعدوى COVID، وهي ما يسمى كوفيد طويل الأمد Long-COVID، والتي يمكن تجنبها من خلال التطعيم.
- يمكن للأطفال نقل عدوى كوفيد-19 - سيمنع التطعيم انتقال العدوى إلى الأطفال الآخرين والفئات العمرية الأكبر سناً، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل الأجداد.
- تطعيم الأطفال الأصغر سناً يعني أيضاً أن هناك تقليلاً في فرص إغلاق المدارس في المستقبل - وهذا سيساعد الأطفال في الحصول على المزيد من التعلم وجهاً لوجه، ووقت اللعب، والمشاركة في أنشطة مختلفة، والتواجد مع أصدقائهم.

الآثار الجانبية للتطعيم لدى الأطفال الصغار

- لقاح فايزر Pfizer آمن وفعال للاستخدام للأطفال بعمر 5-11 عاماً.
- جميع اللقاحات، حالها حال أي دواء آخر، لها آثار جانبية. الآثار الجانبية الأكثر خطورة نادرة جداً.
- يمكن أن يعاني الأطفال من آثار جانبية شائعة ومتوقعة بعد تلقي لقاحات فايزر Pfizer، مثل ألم في الذراع والصداع والتعب. عادة ما تحتاج تلك الآثار إلى العلاج بالباراسيتامول فقط، ونادراً ما يحتاج الأطفال إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج.
- تحدث غالبية الآثار الجانبية بعد اللقاحات في وقت مبكر خلال الأسابيع 6-8 الأولى، مع عدم وجود آثار جانبية طويلة الأمد متوقعة من لقاحات mRNA.
- لا يوجد دليل علمي على أن اللقاحات تؤثر على الخصوبة في المستقبل، ولا يسبب أي من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في أستراليا العقم/انعدام الخصوبة.

المزيد من المعلومات والمصادر

- [توصيات مجموعة ATAGI بشأن استخدام لقاح فايزر Pfizer ضد كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً | وزارة الصحة في الحكومة الأسترالية](#)
- [توافق TGA مؤقتاً على لقاح فايزر Pfizer ضد كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً | وزارة الصحة في الحكومة الأسترالية](#)
- [يودكاست مستشفى الأطفال الملكي Royal Children's Hospital](#)
- [نصوص اجتماعية للتطعيم ضد كوفيد-19 - مصدر Amaze - Autism](#)
- [VaxFACTS - الأسئلة الشائعة حول التطعيم ضد كوفيد-19](#)
- [معلومات التطعيم للأطفال والمراهقين | Coronavirus Victoria](#)
- [مصادر الصحة النفسية للوالدين والعائلات | Coronavirus Victoria](#)

• للحصول على المستند بصيغة أخرى، اتصل هاتفياً بالرقم 1300 651 160، لخدمة التحويل الوطنية (للصم والبكم) استخدم رقم 13 36 77 عند الحاجة، أو بالبريد الإلكتروني COVIDvaccination@health.vic.gov.au

- Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
- © State of Victoria, Australia, Department of Health, December 2021.