

Chinese (Simplified) | 简体中文

5-11岁儿童新冠疫苗接种

父母、监护人和看护人指南

澳大利亚免疫接种技术咨询小组(Australian Technical Advisory Group on Immunisation,简称ATAGI)已批准5至11 岁儿童接种辉瑞(Pfizer)新冠疫苗,这是儿童开始接种疫苗前的最后一道审批。

ATAGI建议该年龄段的疫苗接种为两剂,间隔8周。在特殊情况下,间隔可缩短至最少3周,包括应对疫情爆发,以及在开始重大免疫抑制或国际旅行开始之前。

儿童疫苗可以从12月底开始预约,接种将于2022年1月10日开始。

美国和加拿大已开始为5至11岁儿童进行新冠疫苗接种,此类项目也在欧洲、以色列和其他地区展开。

ATAGI正在继续审查辉瑞儿童疫苗临床试验的可用证据和美国在该年龄段推广疫苗的实际数据。

莫德纳(Moderna)也正在寻求疫苗获批,以加入这一年龄段的疫苗推广。

儿童疫苗将如何得到推广?

按计划疫苗接种可以前往参与该接种的全科医生诊所、药房、由原住民社区主导运营的卫生服务机构,以及适合 全家前往的州立疫苗接种中心。

对疫苗接种有轻微焦虑或轻微行为问题的儿童,以及患有发育障碍、自闭症和/或感官问题的儿童可选择不同的途径并得 到帮助。通过转介至维多利亚州专家免疫服务中心,患有较严重针头恐惧症的儿童可以获得设立在医院的接种服务。

为孩子接种疫苗有什么益处?

益处:提供针对新冠病毒感染和严重疾病的直接保护

- 新冠疫苗可降低感染风险和疾病的严重程度。
- 一些患有肥胖症、唐氏综合症或脑瘫等现有疾病的儿童感染新冠的风险更大。
- 儿童出现严重的症状的情况并不常见,但仍会发生,其中不到2%的有症状儿童需要入院治疗,通常需要吸氧或补液。
- 澳大利亚的成人疫苗接种覆盖率很高,因此新冠感染在未接种疫苗的儿童和青少年中变得更加普遍。在未接种疫苗的老年人中,出现严重症状需要住院治疗,甚至死亡的风险仍然要高得多。
- 一些儿童也会在感染新冠病毒一到两个月后出现慢性症状,也就是"后新冠综合征"。我们对这种并发症了解还不够,但其似乎相对罕见,而且大多数研究显示症状很少在超过三个月后出现。"后新冠综合征"需要进行研究来对 其进一步了解。



• 儿童感染新冠后还有一种罕见的具会延迟发生的综合症。该综合征会导致儿童出现严重症状,并会影响身体的多个器官和系统,被称为儿童多系统炎症综合症(Multisystem Inflammatory Syndrome in children,简称MIS-C)。

益处:减少在家庭、社区和教育场所内的传播

儿童,包括幼儿可以传播新冠病毒。疫苗可以降低病毒传播给其他儿童和年龄较大群体的风险,包括可能面临更高风险的家庭成员,如祖父母。

益处:从最大程度上减少教育场所关闭、旅行重新安排的需要,以及后续负面间接影响

- 在幼儿教育中心、看护服务机构以及学校中减少传播和病例的间接或次要益处是,教育场所更有可能保持开放,儿 童可以有更多的面对面学习、玩耍、参与不同的体育活动以及与朋友交往的机会。
- 儿童可能还需要为国际旅行接种疫苗,因此需要确保在旅行出发计划中考虑接种疫苗的时间范围。

给儿童接种疫苗是否有风险?

- 为5至11岁的儿童接种辉瑞疫苗是安全有效的。在辉瑞疫苗临床试验中,未发现疫苗安全问题和严重副作用。
- 与其他药物一样,所有疫苗都有副作用。较为严重的副作用非常罕见。
- 接种辉瑞疫苗后儿童可能会出现常见和预期中的副作用,如手臂疼痛、头痛和疲劳。这些副作用通常只需要用扑热息痛 治疗,而且儿童很少有接受医生诊治的需要。
- 疫苗接种后的大部分副作用发生在最初的6-8周内,mRNA疫苗没有预期的长期副作用。澳洲国家免疫监督体系(AusVaxSafety)在澳大利亚社区进行持续、强有力的疫苗安全监测,以不断监测常见和严重的副作用。
- 没有科学依据表明疫苗会影响未来的生育能力,而且在澳大利亚使用的新冠疫苗均未导致不孕/不育。

如果您对您的孩子接种新冠疫苗有任何疑问,请向您的医生或医疗保健服务人员咨询。

相关资料

- 如何向孩子们解释新冠疫苗|澳大利亚卫生部
- 疫苗接种诊所查询网页
- https://www.coronavirus.vic.gov.au/who-can-get-vaccinated
- 与您的孩子讨论新冠疫苗
- <u>皇家儿童医院(Royal Children's Hospital)播客</u>
- 关于接种新冠疫苗时会发生什么的情景预演
- VaxFacts 新冠相关问题的提问和回答

