



Chinese (Simplified) | 简体中文

新冠疫苗

5-11 岁儿童的疫苗接种——重要信息

截至2021年12月28日

重要信息

- 5-11 岁儿童现已有资格接种新冠病毒疫苗。
- 澳大利亚免疫接种技术咨询小组（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, 简称 ATAGI）建议5-11岁儿童使用辉瑞（Pfizer）疫苗。
- 该建议以澳大利亚药品管理局（Therapeutic Goods Administration, 简称TGA）对辉瑞疫苗在这一年龄段儿童中使用所给予的临时批准为基础。
- ATAGI建议5-11岁儿童的接种剂量配方为12岁及以上人群剂量的三分之一。
- 预计将从2022年1月10日开始为5-11岁儿童接种疫苗。
- 疫苗接种可以前往参与该接种计划的全科医生诊所、药房、由原住民社区主导运营的卫生服务机构，以及适合全家前往的州立疫苗接种中心。2022年第一学期还将有包括设立在一些小学内的社区疫苗接种诊所提供接种服务。

5-11岁儿童疫苗接种的安全性

- TGA和ATAGI复审了从5-11岁儿童mRNA疫苗接种临床试验获得的临床证据和安全性数据，以及美国在该年龄组疫苗接种中所获得的实际数据。
- 在包括3100名儿童的辉瑞疫苗临床试验中，没有发现疫苗安全问题和严重副作用。
- 在美国，这些疫苗已被用于5-11岁的儿童，大约500万儿童已经接受了第一针疫苗。儿童接种项目也正在加拿大、欧洲、以色列和其他地区展开。
- [澳大利亚免疫监督体系（AusVaxSafety）](#) 在澳大利亚社区进行持续和全面的疫苗安全监测。

残疾或有特殊需求儿童的疫苗接种

- 对疫苗接种有轻微焦虑或轻微行为问题的儿童，以及患有发育障碍、自闭症和/或感官问题的儿童可获得不同的选择和帮助。
- 患有更严重针头恐惧症的儿童也可以得到相关服务。

5-11岁儿童接种疫苗的益处

- 接种疫苗的儿童将获得针对新冠病毒的直接保护。
- 尽管儿童和年轻人在感染新冠病毒后出现严重症状的情况相对于成年人来讲较为少见，但有些儿童的病情仍会变得很严重——包括一些已患某种病症的儿童，如肥胖症、唐氏综合症或脑瘫。
- 一些儿童和青少年在感染新冠病毒一到两个月后也会出现慢性症状，也就是“后新冠综合征”，而这种情况可以通过接种疫苗来避免。
- 儿童可以传播新冠病毒——疫苗可以防止病毒传播给其他儿童和年龄较大的群体，包括可能面临更高风险的家庭成员，如祖父母。
- 为年幼的孩子接种疫苗也意味着未来学校需关闭的可能性更小——这将有助于孩子拥有更多的面对面学习、一起玩耍、参与不同活动以及与朋友在一起的机会。

儿童疫苗接种的副作用

- 为5至11岁的儿童接种辉瑞疫苗是安全有效的。
- 与其他药物一样，所有疫苗都有副作用。较为严重的副作用非常罕见。
- 接种辉瑞疫苗后儿童可能会出现常见和预期中的副作用，如手臂疼痛、头痛和疲劳。这些副作用通常只需要用扑热息痛治疗，而且儿童很少有接受医生诊治的需要。
- 疫苗接种后的大部分副作用发生在最初的6-8周内，而mRNA疫苗没有预期的长期副作用。
- 没有科学依据表明疫苗会影响未来的生育能力，而且在澳大利亚使用的新冠疫苗都不会导致不孕/不育。

获取更多信息和资源

- [ATAGI关于在5至11岁儿童中使用辉瑞新冠疫苗的建议 | 澳大利亚卫生部](#)
- [TGA临时批准在5至11岁儿童中使用辉瑞新冠疫苗 | 澳大利亚卫生部](#)
- [皇家儿童医院 \(Royal Children's Hospital\) 播客](#)
- [新冠疫苗实景预演——Amaze——自闭症资源](#)
- [VaxFACTS——新冠疫苗常见问题](#)
- [儿童和青少年疫苗接种信息 | 维多利亚州新冠病毒信息中心 \(Coronavirus Victoria\)](#)
- [为家长和家庭提供的心理健康资源 | 维多利亚州新冠病毒信息中心 \(Coronavirus Victoria\)](#)

- 如需以其他格式接收本文件，请致电1300 651 160，必要时请使用国家中继服务13 36 77；或发送电子邮件至COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au
- Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
- © State of Victoria, Australia, Department of Health, December 2021.